

CARPINTERO DE CAMPO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



Macho



Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RN	33 cm.	220 gr.	C

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Piciformes
FAMILIA	Picidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Colaptes campestris campestris

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	De setiembre a noviembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Escaso. Rojo debajo y atrás del pico en el macho. En la hembra negro
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Mediana altura
NIDO ZONA	Árboles, barrancas y termiteros
NIDO MATERIALES	
NIDO FORMA	Hueco
HUEVOS NÚMERO	4
HUEVOS INCUBACIÓN	

HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

Es un habitante típico de pastizales, sabanas, bosques abiertos y campos hasta los 800 metros.

Es sedentario, territorial y de hábitos terrestres, se alimenta en el suelo dando saltitos y hasta caminando.

Come casi exclusivamente hormigas y termitas.

Muy ocasionalmente puede ingerir frutos.

La actividad reproductiva comienza con la selección del sitio para nidificar, usualmente árboles, palmeras y postes, aunque en áreas de pastizales pueden excavar antiguos termiteros o bancos de tierra blanda para hacer sus nidos.

Aquellas parejas que usan huecos en árboles suelen reutilizarlos al menos dos años seguidos.

La nidada se compone de cuatro a cinco huevos blancos de forma elíptica.