
CHINGOLO CEJA AMARILLA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

(Ver referencias)



Macho

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



www.avesdeuruguay.com




Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



Praderas

ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	13 cm.	BC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Emberizidae
NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Ammodramus humeralis</i>

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	De octubre a febrero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Hembra más pálida que el macho, sin negro y amarillo en la cabeza
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En el suelo o entre las matas
NIDO ZONA	Zonas de arbustos, praderas y pastizales cortos
NIDO MATERIALES	Raicillas y pasto
NIDO FORMA	Semiesférico

HUEVOS NÚMERO	4
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancuzcos
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

www.avesdeuruguay.com