PATO BRASILERO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluída

MENÚ - INICIO

Macho

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN

www.avesdeuruguay.com

Hembra

Macho, hembra y pichones

(Más imágenes)

Sonidos

Sonograma

Descargar esta ficha

HÁBITAT

www.avesdeuruguay.com

Ambientes acuáticos

ESTATUS	TAMAÑO	PESO	ENVERGADURA	PRESENCIA
RP	38 cm.	600 gr. a 800 gr.	52 cm. a 65 cm.	C

ORIGEN

AUTÓCTONA

(Ver referencias)

ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Amazonetta brasiliensis ipecutiri

Más del mismo ORDEN

Buscar

Bibliografia

REPRODUCCION

EPOCA	
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Pico rojo en el macho. Pico negro en la hembra.

www.avesdeuruguay.com

PAREJA PERMANENTE	Siempre se ve a los dos individuos juntos
HEMBRA	Incubación
MACHO	Protege el nido y cría a los pichones
RITUAL DE APAREAMIENTO	El macho nada alrededor de la hembra, persecuciones, voces características (silbidos)
NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Cerca del agua pero no junto a ella. En pastos muy altos
NIDO MATERIALES	Vegetales
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente de 6 a 14
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 25 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta que son adultos

Tiene una coloración parda general que sólo se interrumpe por algunas manchas negras en los flancos y una corona oscura que desciende por el cuello como una faja.
Presenta una coloración negra en la rabadilla, las alas y la cola, visibles en vuelo.
Las patas son rojas.
Existe dimorfismo sexual: la hembra es algo más chica que el macho y posee el pico negruzco.
Tiene una mancha loral supra ocular y la garganta blancas.
El pico del macho es rojo.
Habita humedales rodeados por vegetación densa.
Se alimenta de insectos y crustáceos.
La nidada puede contener entre 6 y 14 huevos, que son incubados por la hembra durante 25 días.

www.avesuruguay.com