
PATO CABEZA NEGRA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



Macho

MENÚ - INICIO

ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN





Hembra

[\(Más imágenes\)](#)


Sonidos



Sonograma



www.avesdeuruguay.com
aves.uy@gmail.com



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ORIGEN

ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RN	38 cm.	550 gr.	PC

[\(Ver referencias\)](#)



AUTÓCTONA

ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Heteronetta atricapilla

Más del mismo ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN (Parásito)

ÉPOCA	Octubre a febrero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Macho con pico negro, rojo en su base. Cabeza y cuello negro. Hembra pico gris con base amarilla. Cabeza parda con ceja y garganta blanquecina
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Pone en nidos de otras aves (Cuervillos, gallaretas, garzas, etc.)
NIDO ZONA	Cercana al agua
NIDO MATERIALES	Según su hospedero
NIDO FORMA	Según su hospedero
HUEVOS NÚMERO	En nidos acuáticos

HUEVOS INCUBACIÓN	21 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	El pichón abandona el nido a las pocas horas de nacer y se cría solo

www.avesdeuruguay.com