


PATO CAPUCHINO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

[MENÚ - INICIO](#)



[\(Más imágenes\)](#)

[Sonidos](#)



[Sonograma](#)

[ZONAS DE DISTRIBUCIÓN](#)



[Descargar esta
ficha](#)

[HÁBITAT](#)



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	M: 41 cm. H: 34 cm.	C

ORIGEN



(Ver referencias)





ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Anas versicolor versicolor

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCION	
EPOCA	Octubre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Escaso
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	Balaneo de cabeza, vocalizaciones y vuelos cortos

NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Pastos altos algo alejados del agua
NIDO MATERIALES	Plumón
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 8
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 20 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Ocre cremosos
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta adultos