
PATO DE COLLAR

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



Macho

MENÚ - INICIO

ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN






Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



Ambientes
acuáticos

ESTATUS

TAMAÑO

PESO

PRESENCIA

ORIGEN

RN

36 cm.

360 gr.

PC

AUTÓCTONA

[\(Ver referencias\)](#)

ORDEN

Anseriformes

FAMILIA

Anatidae

NOMBRE CIENTÍFICO

Callonetta leucophrys

 Más del
mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Octubre a febrero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Macho: línea negra del pico a la nuca y parte posterior del cuello. En la hembra línea parda
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Mediana altura
NIDO ZONA	Árboles
NIDO MATERIALES	Plumón
NIDO FORMA	Hueco de árboles o nidos de cotorras
HUEVOS NÚMERO	Hasta 12
HUEVOS INCUBACIÓN	

HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancuzcos
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	

www.avesdeuruguay.com