

PATO OVERO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO



Macho

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Hembra



Juvenil



(Más imágenes)

Sonidos



Descargar esta
ficha

Sonograma



HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	M: 48cm. H: 38 cm.	PC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Anas sibilatrix

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCION

EPOCA	
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia

Buscar

Bibliografía

DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	La cabeza del macho es más oscura, brillante y con reflejos
PAREJA PERMANENTE	Si
HEMBRA	Incuba la mayor parte del tiempo cría los pichones
MACHO	Ayuda en la incubación y cuida a los pichones
RITUAL DE APAREAMIENTO	El macho apunta el pico hacia la hembra. Voces características. Hunde el pico, saca agua y la deja chorrear
NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Cerca del bañado, pero alejado del agua
NIDO MATERIALES	Mucho plumón
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 10
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 20 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Crema
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta adultos