

PATO ZAMBULLIDOR

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO



Macho adulto

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Macho juvenil



Hembra



Cortejo

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ORIGEN



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
VI	M: 38 cm. H: 31 cm.	PC

[\(Ver referencias\)](#)



ORDEN	Anseriformes
FAMILIA	Anatidae
NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Oxyura vittata</i>

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCION

EPOCA	Fines de setiembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Macho cabeza negra y pico celeste. Hembra sin cabeza negra con banda debajo del ojo
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	Macho "infla" el cuello, mete la cabeza en el agua, sonido característico. Agresivo. Hembra hace sonidos característicos y se aproxima al macho
NIDO POSICIÓN	Sobre el agua
NIDO ZONA	Vegetación emergente
NIDO MATERIALES	Vegetales del lugar
NIDO FORMA	Plataforma
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 6 o 7
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 20 días de incubación

HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidífugos
PICHÓN CON LOS PADRES	Hasta adultos

www.avesdeuruguay.com