


PICAFLOR DE BARBIJO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
Apéndice II



Macho

[MENÚ - INICIO](#)

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Descargar esta
ficha

Sonograma



www.avesdeuruguay.com
aves.uy@gmail.com

HÁBITAT



ORIGEN

ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RV	10 cm.	7 gr.	PC

[\(Ver referencias\)](#)



AUTÓCTONA

ORDEN

Apodiformes

FAMILIA

Trochilidae

NOMBRE CIENTÍFICO

Heliomaster furcifer

Más del
mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Octubre a noviembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Podría ser poliginia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Marcado. Macho con colores granate rojizos con reflejos tornasolados. La hembra es verde y grisáceo en el vientre
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	Incuba, cría y protege
MACHO	Copula
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Alto a muy alto
NIDO ZONA	Árboles
NIDO MATERIALES	Fibras vegetales y lana. Forrado externamente con líquenes.
NIDO FORMA	Tacita apoyada sobre ramas
HUEVOS NÚMERO	2
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 15 días

Buscar

Bibliografía

HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	30 días