
AGUATERO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



[MENÚ - INICIO](#)

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RN	20 cm.	65 gr. a 86 gr.	PC

ORIGEN



(Ver referencias)



ORDEN	Charadriiformes
FAMILIA	Rostratulidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Nycticryphes (Rostratula) semicollaris

Más del mismo ORDEN

Buscar

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Depende del nivel del agua del hábitat y de
-------	---

Bibliografía

	los alimentos. Puede ser en cualquier época del año
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	Orilla de bañados y esteros con abundante vegetación
NIDO MATERIALES	Vegetales y barro. En ocasiones directamente sobre el suelo
NIDO FORMA	Plataforma
HUEVOS NÚMERO	2 o 3
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	
PICHÓN TIPO	
PICHÓN CON LOS PADRES	

También llamado aguatero americano, tiene patas palmeadas y pico largo y algo curvo.

La hembra puede ser un poco más grande y de plumaje levemente más contrastado.

Más activo al atardecer, suele estar oculto y es sigiloso.

Su vuelo es bajo, corto, recto y silencioso.

Habita pantanos, sabanas y pastizales inundados.

Come pequeños animales y semillas que halla en el barro o en aguas someras.

Monógamo, forma colonias para nidificar entre julio y febrero.

La nidada consta de 2 o 3 huevos.