
AGUILUCHO LOMO ROJO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
Apéndice II



Macho fase normal

MENÚ - INICIO

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN





Hembra fase normal



Fase oscura



Fase rufa

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

HÁBITAT



Montes autóctonos



Praderas



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
VI	♀ 55 cm. ♂ 46 cm.	R

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN

Accipitriformes

FAMILIA	Accipitridae
NOMBRE CIENTÍFICO	Geranoaetus (Buteo) polyosoma polyosoma

Más del mismo ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN (No nidifica en el país)

ÉPOCA	
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Dependiendo de los morfos, Ver imágenes más arriba
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	
NIDO ZONA	Árboles y arbustos espinosos. En salientes rocosas en acantilados
NIDO MATERIALES	Ramas secas, en el interior pasto y estiércol
NIDO FORMA	Gran plataforma, 100 centímetro de diámetro
HUEVOS NÚMERO	2 o 3
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos con manchas rojizas y pardas

PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

www.avesdeuruguay.com