

# CAMINERA

**LISTA ROJA DE IUCN**  
**(LC) Preocupación menor**

**CLASIFICACIÓN CITES**  
**No Incluida**



[\(Más imágenes\)](#)

## Sonidos



## Sonograma

[MENÚ - INICIO](#)

## ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



[Descargar esta  
ficha](#)

**HÁBITAT**



www.avesdeuruguay.com  
aves.uy@gmail.com

ESTATUS	TAMAÑO	PESO	PRESENCIA
RN	16 cm.	26 gr.	PC

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Furnariidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Geositta cunicularia cunicularia



# REPRODUCCIÓN

Buscar

Bibliografía

<b>ÉPOCA</b>	Octubre a noviembre
<b>TIPO DE REPRODUCCIÓN</b>	Monogamia
<b>DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS</b>	No existe
<b>PAREJA PERMANENTE</b>	Si
<b>HEMERA</b>	Construye el nido, incuba y alimenta
<b>MACHO</b>	Construye el nido, incuba y alimenta
<b>RITUAL DE APAREAMIENTO</b>	
<b>NIDO POSICIÓN</b>	Cerca del pasto (alto) en el perfil de la barranca
<b>NIDO ZONA</b>	Barrancas, principalmente de erosión humana. Generalmente siguen anidando siempre en la misma zona
<b>NIDO MATERIALES</b>	Crines y vegetales
<b>NIDO FORMA</b>	Túnel largo (más de 1 m.), al fondo una cámara de incubación
<b>HUEVOS NÚMERO</b>	3
<b>HUEVOS INCUBACIÓN</b>	
<b>HUEVOS CARACTERÍSTICAS</b>	Blancos
<b>PICHÓN TIPO</b>	Nidícolas
<b>PICHÓN CON LOS PADRES</b>	

Dorso pardusco.

Ceja blanca.

Pico relativamente largo y fino con leve curvatura.

Ventral ocráceo.

Pecho estriado de pardo.

Alas canelas con puntas pardo oscuro.

Cola negruzca con base canela.

Balancea el tercio posterior del cuerpo.

En médanos, suelos descubiertos con barrancos cercanos.

Desplazándose para alimentarse a arenales o zonas de poco tapiz herbáceo.

Generalmente en pareja.

Muy terrestre, camina y agita su cola casi constantemente.

Se alimenta de insectos, arañas y semillas.

Es común verla caminar entre las médanos y desplazarse con cortos y bajos vuelos.

Voz trinado, un sonido prolongado.

[www.avesdeuruguay.com](http://www.avesdeuruguay.com)