

CHIMANGO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
Apéndice II

[MENÚ - INICIO](#)



ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



[Descargar esta ficha](#)

Sonograma

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PESO	ENVERGADURA	PRESENCIA
RN	41 cm.	290 gr. a 300 gr.	80 cm. a 99 cm.	PC

ORIGEN



(Ver referencias)



ORDEN	Falconiformes
FAMILIA	Falconidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Milvago chimango chimango

Más del mismo
ORDEN

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	De agosto a febrero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia. Raramente en colonias puras o mixtas
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	

Buscar

Bibliografía

HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	Discreto
NIDO POSICIÓN	En el suelo o sobre árboles
NIDO ZONA	Pradera y bañados
NIDO MATERIALES	Pequeñas ramas revestido de lana, crines, vegetales. Se reutiliza
NIDO FORMA	Plataforma
HUEVOS NÚMERO	De 2 hasta 5
HUEVOS INCUBACIÓN	30 días
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blanco sucio y pequeños puntos rojizos
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

Se lo encuentra desde la costa hasta las llanuras en donde la vegetación no es muy alta, así como en bosques despejados hasta los 1.000 m.

Es oportunista y su dieta incluye carroña y animales pequeños.

Su pico es débil.

Cada pareja construye en conjunto su nido, allí la hembra pone 2 o 3 y hasta 5 huevos que incuban durante un mes; a las 5 semanas los pichones abandonan el nido.

Sin dimorfismo sexual, machos y hembras son indistinguibles, ya que tienen color y tamaño semejantes.