

CUERVO CABEZA NEGRA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

MENÚ - INICIO

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



Descargar esta
ficha

HÁBITAT





ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RP	64 cm.	PC

(Ver referencias)



ORIGEN



ORDEN	Cathartiformes
FAMILIA	Cathartidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Coragyps atratus foetens

Más del mismo ORDEN

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Desde octubre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia

Buscar

Bibliografía

DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	Incuba y cría
MACHO	Vigila
RITUAL DE APAREAMIENTO	Se siguen en vuelo
NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Quebradas con abundantes árboles. En las paredes o en huecos de los árboles
NIDO MATERIALES	Ninguno
NIDO FORMA	
HUEVOS NÚMERO	2
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos con manchas chocolate
PICHÓN TIPO	Seminidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	Varias semanas

Son los buitres del Nuevo Mundo.

Los Buitres del nuevo mundo ponen dos huevos.

Los períodos de incubación y de crianza son los más prolongados entre las aves de presa.

Carecen de siringa, por lo cual no emiten vocalizaciones.

Son carroñeros, y suplementan su dieta con huevos, pichones moribundos y hasta frutas.

Su cabeza y cuello desplumados exponen la piel al sol, una adaptación para su higiene y salud.

Es gregario y habita en bosques y planicies.

Son capaces de aprovechar los residuos, lo que explica gran parte de su éxito.

No duda en atacar presas vivas, como pichones de aves o pequeños mamíferos.

Se agrupa en playas para capturar crías de tortuga.

Depositán dos huevos en lugares muy variados que incluyen cuevas, huecos en barrancos y árboles, y hasta cavidades en edificios.

Ambos huevos son incubados por 35 días y los pollos están listos para dejar el nido a los 70 días.