CUERVO CABEZA ROJA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluída

(Más imágenes)

Sonidos

Sonograma

MENÚ - INICIO

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN

Descargar esta ficha

HÁBITAT

www.avesdeuruguay.com



Montes autóctonos

Praderas

ESTATUS	TAMAÑO	ENVERGADURA	PRESENCIA
RN	62 cm. a 76 cm.	170 cm. a 183 cm.	C

ORIGEN

AUTÓCTONA

(Ver referencias)

ORDEN	Cathartiformes
FAMILIA	Cathartidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Cathartes aura ruficollis

Más del mismo ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Setiembre a enero
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia

www.avesdeuruguay.com

DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	En vuelo el macho sigue a la hembra volando por encima.
NIDO POSICIÓN	Del suelo hasta varios metros de altura
NIDO ZONA	Lugares sombríos, en paredones, cuevas y árboles
NIDO MATERIALES	Ninguno
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	Aproximadamente 2
HUEVOS INCUBACIÓN	Alrededor de 30 días de incubación
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Cremosos con manchas pardas
PICHÓN TIPO	Seminidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	Varias semanas

Son los buitres del Nuevo Mundo.
Los Buitres del nuevo mundo ponen dos huevos.
Los períodos de incubacióny de crianza son los más prolongados entre las aves de presa.
Carecen de siringe, por lo cual no emiten vocalizaciones.
Son carroñeros,y suplementan su dieta con huevos, pichones moribundos y hasta frutas.
Su cabeza y cuello desplumados exponen la piel al sol, una adaptación para su higiene y salud.

El Buitre de cabeza roja es el de mayor distribución.
Habita planicies, desiertos, bosques y selvas y suele formar grupos junto Buitres de cabeza negra (Cathartes atratus).
En Centroamérica migran junto a otras especies de rapaces.
Su olfato agudo, el más desarrollado entre sus parientes, le permite localizar cadáveres.
Ambos progenitores comparten roles.

www.avesdeuruguay.com