
GARIBALDINO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

(Ver referencias)



Macho

ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN





Hembra

Máxima

ondo



onog m



Descargar esta
ficha

H I T



O GEN



E T TU	T M ÑO	P E EN I
RP	18 cm.	BC

(Ver referencias)



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Icteridae
NOMBRE CIENTÍFICO	Chrysomus (Agelaius) ruficapillus

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Octubre a marzo
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	Marcado. Macho negrusco con corona, cuello y pecho rojizo. Hembra más pequeña que el macho y parda aceitunada
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	Construye el nido
MACHO	Construye el nido
RITUAL DE APAREAMIENTO	El macho delimita territorio. Cuando pasa una hembra vuela y hace llamados
NIDO POSICIÓN	Enlazado a la vegetación emergente. Generalmente en colonias
NIDO ZONA	Bañados, zonas inundables y arrozales
NIDO MATERIALES	Fibras vegetales
NIDO FORMA	Taza
HUEVOS NÚMERO	3 o 4
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos celestones con pintas negras en el polo obtuso

P HÓN TPO	Nidícolas
P HÓN ON LOS PADRES	

www.avesdeuruguay.com