
LOICA PAMPEANA

LISTA ROJA DE IUCN
(EN) En peligro

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida

MENÚ - INICIO



Macho

**ZONAS DE
DISTRIBUCIÓN**





Hembra

[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



Praderas

www.avesdeuruguay.com
aves.uy@gmail.com

ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RN	21 cm.	R

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN



ORDEN	Passeriforme
FAMILIA	Icteridae
NOMBRE CIENTÍFICO	Leistes (Sturnella) defilippii

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN

ÉPOCA	Octubre a diciembre
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monógama
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	El macho presenta colores más fuertes y vistosos que la hembra (ver imágenes más arriba)
PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	El macho vuela delimitando su territorio. Luego se eleva y desciende cantando y planeando. La hembra se oculta en el pastizal.
NIDO POSICIÓN	En el suelo
NIDO ZONA	En la pradera
NIDO MATERIALES	Raíces y pajitas
NIDO FORMA	Taza
HUEVOS NÚMERO	4
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos con manchas oscuras, marrones en el polo romo
PICHÓN TIPO	Nidícola
PICHÓN CON LOS PADRES	