
REMOLINERA

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida



[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma

ZONAS DE DISTRIBUCIÓN



Descargar esta
ficha

HÁBITAT



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
VI	18 cm.	BC

[\(Ver referencias\)](#)



ORIGEN





ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Furnariidae
NOMBRE CIENTÍFICO	Cinclodes fuscus

Más del mismo
ORDEN

Buscar

Bibliografía

REPRODUCCIÓN (No se reproduce en el país)	
ÉPOCA	
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia.
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe

PAREJA PERMANENTE	
HEMBRA	
MACHO	
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	Suelo
NIDO ZONA	Barrancos, en huecos en el suelo o construye cuevas
NIDO MATERIALES	
NIDO FORMA	Depresión en el suelo
HUEVOS NÚMERO	3
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blancos
PICHÓN TIPO	Nidícolas
PICHÓN CON LOS PADRES	

Dorso pardo terroso.

Ceja blanca pronunciada.

Garganta blanca.

Ventral ceniciento, más oscuro en los flancos.

Vuelo bajo y ondulado.

Cuando vuela se destaca banda alar ocrácea.

Se encuentra en costas, zonas rocosas, campos abiertas, generalmente cerca del agua.

Solitario o en pareja.

Despliegue con alas verticales y vocalizando.

Emite trinos y otras notas agudas.

Cuando migra se le puede ver en grupos pequeños.

Recorre orillas de playas y rocas en busca de insectos e invertebradas.

Rara vez se lo ve posado en árboles o arbustos bajos.

Realiza algunos movimientos con la cola entreabriéndola sin levantarla, de allí el otro nombre común, Menea cola.

Confiada.