
TREPADOR OSCURO

LISTA ROJA DE IUCN
(LC) Preocupación menor

CLASIFICACIÓN CITES
No Incluida




[\(Más imágenes\)](#)

Sonidos



Sonograma



ESTATUS	TAMAÑO	PRESENCIA
RR	25 cm.	○

[\(Ver referencias\)](#)



ORDEN	Passeriformes
FAMILIA	Furnariidae

REPRODUCCIÓN (No existen registros para el país)

ÉPOCA	Noviembre a marzo en sur de Brasil y de octubre a enero en el Chaco húmedo y selva Atlántica de Argentina
TIPO DE REPRODUCCIÓN	Monogamia
DIMORFISMO SEXUAL ADULTOS	No existe
PAREJA PERMANENTE	
HEMERA	Construcción del nido, incubación, limpieza del nido y cría de los pichones
MACHO	Construcción del nido, incubación, limpieza del nido y cría de los pichones
RITUAL DE APAREAMIENTO	
NIDO POSICIÓN	En huecos de árboles, a 3-7 m de altura
NIDO ZONA	
NIDO MATERIALES	Los huecos usados estaban alfombrados con pedazos duros de corteza del árbol nido o árboles cercanos
NIDO FORMA	45-46 cm de profundidad, con diámetros de entrada de 5-7 cm
HUEVOS NÚMERO	2 a 4
HUEVOS INCUBACIÓN	
HUEVOS CARACTERÍSTICAS	Blanco opacos, 31.4 ± 1.1 mm x 23.5 ± 0.57 mm (n = 39) Peso 9 ± 1 g (n = 32)
PICHÓN TIPO	Nidícola
PICHÓN CON LOS PADRES	Pichones recientemente eclosionados tienen la piel rosada con plumón gris, el interior de la boca amarilla y grandes comisuras

blancuzcas. Abrieron sus ojos cuando tenían 6-7 días de edad. Volaron con 16-18 días.